

Гелюсил

Автор: admin
13.10.2006 01:49 -

Гелюсил

Страна-производитель

Германия

Фарм-группа

Вяжущие, обволакивающие и антацидные средства на основе алюминия

Производители

Гедеке/Парке-Дейвис(Германия)

Международное название

Сималдрат

Синонимы Гелусил лак, Гелусил-лак, Гелусил-суспензия, Гелюсил Лак, Гелюсил Ликвид

Лекарственные формы

таблетки, суспензия

Состав Действующее вещество - сималдрат.

Показания к применению

Острый и хронический гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией желудка в фазе обострения, острый дуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, постхолецистэктомический синдром, хронический панкреатит, холецистит, синдром оперированного желудка, диспепсия, неприятные ощущения или боли в эпигастрии, изжога после избыточного употребления алкоголя, никотина, кофе, др. нарушений диеты, приема лекарственных средств.

Противопоказания

Гиперчувствительность, тяжелые формы почечной недостаточности, беременность, лактация, детский возраст до 10 лет.

Побочное действие

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, запор, диарея, изменение вкусовых ощущений. Со стороны мочевыделительной системы: гиперкальциурия,

Гелюсил

Автор: admin
13.10.2006 01:49 -

нефрокальциноз, почечная недостаточность. Со стороны обмена веществ: гипермагниемия, гипокальцемия, гиперкальциурия, гипералюминиемия. Прочие: аллергические реакции, остеомаляция, остеопороз, энцефалопатия.

Взаимодействие

Уменьшает всасывание железа, тетрациклинов, пропранолола, изониазида (интервал между приемами должен составлять не менее 2 ч). При применении препарата вместе с соками из цитрусовых повышается вероятность развития гипермагниемии.

Передозировка

Данных нет.

Особые указания

При диабете или повышенной чувствительности к молочным белкам предпочтительнее суспензия, не содержащая молочный порошок и сахар. У больных с нарушениями функции почек следует регулярно контролировать содержание магния, и избегать длительного применения в высоких дозах. Интервал между приемом препарата и других лекарственных средств должен составлять не менее 2 часов.

Литература

Энциклопедия лекарств 2003 г. Справочник "Видаль 2006".