

## **Гелюсил**

Автор: admin  
13.10.2006 01:49 -

---

Гелюсил

### **Страна-производитель**

Германия

### **Фарм-группа**

Вяжущие, обволакивающие и антацидные средства на основе алюминия

### **Производители**

Гедеке/Парке-Дейвис(Германия)

### **Международное название**

Сималдрат

Синонимы Гелусил лак, Гелусил-лак, Гелусил-суспензия, Гелюсил Лак, Гелюсил Ликвид

### **Лекарственные формы**

таблетки, суспензия

Состав Действующее вещество - сималдрат.

### **Показания к применению**

Острый и хронический гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией желудка в фазе обострения, острый дуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, постхолецистэктомический синдром, хронический панкреатит, холецистит, синдром оперированного желудка, диспепсия, неприятные ощущения или боли в эпигастрии, изжога после избыточного употребления алкоголя, никотина, кофе, др. нарушений диеты, приема лекарственных средств.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность, тяжелые формы почечной недостаточности, беременность, лактация, детский возраст до 10 лет.

### **Побочное действие**

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, запор, диарея, изменение вкусовых ощущений. Со стороны мочевыделительной системы: гиперкальциурия,

## **Гелюсил**

Автор: admin  
13.10.2006 01:49 -

---

нефрокальциноз, почечная недостаточность. Со стороны обмена веществ: гипермагниемия, гипокальцемия, гиперкальциурия, гипералюминиемия. Прочие: аллергические реакции, остеомаляция, остеопороз, энцефалопатия.

### **Взаимодействие**

Уменьшает всасывание железа, тетрациклинов, пропранолола, изониазида (интервал между приемами должен составлять не менее 2 ч). При применении препарата вместе с соками из цитрусовых повышается вероятность развития гипермагниемии.

### **Передозировка**

Данных нет.

### **Особые указания**

При диабете или повышенной чувствительности к молочным белкам предпочтительнее суспензия, не содержащая молочный порошок и сахар. У больных с нарушениями функции почек следует регулярно контролировать содержание магния, и избегать длительного применения в высоких дозах. Интервал между приемом препарата и других лекарственных средств должен составлять не менее 2 часов.

### **Литература**

Энциклопедия лекарств 2003 г. Справочник "Видаль 2006".