

Дипиридамо́л-Ферейн

Автор: admin
15.04.2007 14:00 -

Дипиридамо́л-Ферейн

Страна-производитель

Россия

Фарм-группа

Антиагреганты

Производители

Брынцалов-А(Россия)

Международное название

Дипиридамо́л

Синонимы Апо-Дипиридамо́л, Дипиридамо́л, Курантил, Курантил N25, Курантил N25 (Дипиридамо́л), Курантил N75, Курантил N75 (Дипиридамо́л), Парседил, Пенселин, Персантин, Тромбонил

Лекарственные формы

таблетки покрытые оболочкой 25мг

Состав Действующее вещество - дипиридамо́л.

Показания к применению

Профилактика тромбоэмболического синдрома после операции протезирования клапанов сердца, профилактика окклюзии стентов и аортокоронарных шунтов (в комбинации с аспирином), периферические сосудистые поражения, профилактика плацентарной недостаточности при осложненной беременности, лечение и профилактика синдрома дессиминированного внутрисосудистого свертывания у детей при инфекционных токсикозах и септицемии, трехкомпонентное лечение гломерулонефрита, синдром подавления тромбоцитов у детей, проведение дипиридамо́л-таллиевой-201 перфузионной сцинтиграфии с физической нагрузкой, дипиридамо́ловой стресс-эхокардиографии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность, острый инфаркт миокарда, выраженное атеросклеротическое поражение коронарных сосудов с развитой системой коллатералей, предрасположенность к гипотонии, выраженные нарушения внутрижелудочковой проводимости, тяжелая артериальная гипертензия, тяжелые

нарушения функции печени, геморрагические диатезы, обструктивные заболевания легких, II и III триместры беременности, детский и подростковый возраст (до 12 лет).

Побочное действие

Тошнота, дискомфортные ощущения в животе, покраснение лица, синдром коронарного обкрадывания (обострение ишемической болезни сердца), головные боли, головокружение, кровотечения, гипотония, тромбоцитопения, изменения функциональных свойств тромбоцитов, тахикардия, брадикардия, слабость, сыпь.

Взаимодействие

Антациды уменьшают максимальную концентрацию из-за снижения абсорбции. Непрямые антикоагулянты и аспирин усиливают эффект, производные ксантина ослабляют (особенно коронарорасширяющий), гепарин повышает риск развития геморрагических осложнений.

Передозировка

При передозировке возможна кратковременная гипотензия. Лечение: введение вазопрессорных агентов.

Особые указания

Нарушение функции печени и обструкция желчевыводящих путей обуславливают необходимость уменьшения дозы. При возникновении синдрома коронарного обкрадывания для улучшения внутрисердечного кровотока показано назначение аминофиллина.

Литература

Энциклопедия лекарств 2003 г.