

## **Дипиридамо́л-Ферейн**

Автор: admin  
15.04.2007 14:00 -

---

Дипиридамо́л-Ферейн

### **Страна-производитель**

Россия

### **Фарм-группа**

Антиагреганты

### **Производители**

Брынцалов-А(Россия)

### **Международное название**

Дипиридамо́л

Синонимы Апо-Дипиридамо́л, Дипиридамо́л, Курантил, Курантил N25, Курантил N25 (Дипиридамо́л), Курантил N75, Курантил N75 (Дипиридамо́л), Парседил, Пенселин, Персантин, Тромбонил

### **Лекарственные формы**

таблетки покрытые оболочкой 25мг

Состав Действующее вещество - дипиридамо́л.

### **Показания к применению**

Профилактика тромбоэмболического синдрома после операции протезирования клапанов сердца, профилактика окклюзии стентов и аортокоронарных шунтов (в комбинации с аспирином), периферические сосудистые поражения, профилактика плацентарной недостаточности при осложненной беременности, лечение и профилактика синдрома дессиминированного внутрисосудистого свертывания у детей при инфекционных токсикозах и септицемии, трехкомпонентное лечение гломерулонефрита, синдром подавления тромбоцитов у детей, проведение дипиридамо́л-таллиевой-201 перфузионной сцинтиграфии с физической нагрузкой, дипиридамо́ловой стресс-эхокардиографии.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность, острый инфаркт миокарда, выраженное атеросклеротическое поражение коронарных сосудов с развитой системой коллатералей, предрасположенность к гипотонии, выраженные нарушения внутрижелудочковой проводимости, тяжелая артериальная гипертензия, тяжелые

нарушения функции печени, геморрагические диатезы, обструктивные заболевания легких, II и III триместры беременности, детский и подростковый возраст (до 12 лет).

### **Побочное действие**

Тошнота, дискомфортные ощущения в животе, покраснение лица, синдром коронарного обкрадывания (обострение ишемической болезни сердца), головные боли, головокружение, кровотечения, гипотония, тромбоцитопения, изменения функциональных свойств тромбоцитов, тахикардия, брадикардия, слабость, сыпь.

### **Взаимодействие**

Антациды уменьшают максимальную концентрацию из-за снижения абсорбции. Непрямые антикоагулянты и аспирин усиливают эффект, производные ксантина ослабляют (особенно коронарорасширяющий), гепарин повышает риск развития геморрагических осложнений.

### **Передозировка**

При передозировке возможна кратковременная гипотензия. Лечение: введение вазопрессорных агентов.

### **Особые указания**

Нарушение функции печени и обструкция желчевыводящих путей обуславливают необходимость уменьшения дозы. При возникновении синдрома коронарного обкрадывания для улучшения внутрисердечного кровотока показано назначение аминофиллина.

### **Литература**

Энциклопедия лекарств 2003 г.