

Лактулоза Поли

Автор: admin
07.09.2008 12:44 -

Лактулоза Поли

Страна-производитель

Италия

Фарм-группа

Синтетические слабительные средства

Производители

Поли Индустрия Кимика С.п.А. произведено Доппель Фармацеутици С.р.Л.(Италия)

Международное название

Лактулоза

Синонимы Дюфалак, Лактулоза, Лактулоза сироп, Ливо-лак, Нормазе, Порталак, Порталак

Лекарственные формы

сироп 50%

Состав Активное вещество: Лактулоза.

Показания к применению

Запор (в т.ч. хронический), печеночная энцефалопатия, включая кому и прекому, нарушение флоры кишечника (в т.ч. при сальмонеллезах, шингеллезах и др.), синдром гнилостной диспепсии у детей раннего возраста, болевой синдром после удаления геморроидальных узлов.

Противопоказания

Гиперчувствительность, галактоземия, непроходимость кишечника.

Побочное действие

Метеоризм, диарея, спазмы, тошнота, рвота, дискомфорт, потеря электролитов.

Взаимодействие

Антибиотики (неомицин) и неабсорбируемые антациды снижают эффект.
Рекомендуется не принимать лактулозу в течение 2 часов после приема другого

лекарственного средства.

Передозировка

Симптомы: диарея, боль в области живота. Лечение: прием препарата следует прекратить.

Особые указания

С осторожностью применяют у больных сахарным диабетом (особенно при лечении печеночной энцефалопатии) и с непереносимостью лактозы. При появлении диареи лечение отменяют. При гастрокардиальном синдроме следует постепенно увеличивать дозы, чтобы избежать метеоризма; обычно метеоризм исчезает самостоятельно после 2-3 дня лечения. Нельзя назначать на фоне болей в животе, тошноты и рвоты. При длительном лечении (более 6 мес) повышенными дозами следует регулярно контролировать уровень электролитов в сыворотке. Если запор не устранен при приеме препарата в течение нескольких дней или состояние вновь ухудшается после прекращения приема препарата, следует обратиться к врачу.

Литература

Энциклопедия лекарств, 2004г.