

Мегестрола ацетат

Автор: admin
03.12.2008 18:59 -

Мегестрола ацетат

Фарм-группа

Ингибиторы секреции лютеинизирующего гормона

Международное название

Мегестрол

Синонимы Мегаплекс, Мегейс

Состав Активное вещество: Мегестрол.

Показания к применению

Диссеминированный рак молочной железы, рецидивирующий неоперабельный рак эндометрия, рак яичников, рак предстательной железы (паллиативное лечение); анорексия, кахексия и значительное (без явных причин) снижение массы тела у больных СПИДом, кахексия у инкурабельных онкологических пациентов.

Противопоказания

Рецидивирующий тромбоз, беременность (первые 4 месяца).

Побочное действие

Кровянистые выделения из влагалища, задержка жидкости, тромбофилические состояния, синдром Иценко - Кушинга, боль в животе и в грудной клетке, запор, сухость во рту, гепатомегалия, кардиомиопатия, депрессия, парестезии, судороги, одышка, кашель, тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии, алопеция, гипергликемия, гипофизарно-надпочечниковые нарушения.

Взаимодействие

Нет сведений.

Передозировка

Нет сведений.

Особые указания

Решать вопрос о назначении при раке молочной железы следует после определения рецепторного связывания эстрогена и/или прогестерона опухолевыми клетками. До

Мегестрола ацетат

Автор: admin

03.12.2008 18:59 -

начала лечения по поводу кахексии должно быть проведено детальное обследование для уточнения причины снижения массы тела.