

## **Омакор**

Автор: admin  
01.05.2009 09:03 -

---

Омакор

### **Страна-производитель**

Дания

### **Фарм-группа**

Другие гиполипидемические средства

### **Производители**

Солвей Фармасьютикалз ГмбХ, произведено ГМ Пэк(Дания)

### **Международное название**

Омега-3 триглицериды

Синонимы Витрум Кардио омега-3

### **Лекарственные формы**

капсулы

Состав Активные вещество: этиловые эфиры омега-3-кислот.

### **Показания к применению**

Профилактика состояний, вызванных нарушением липидного обмена, в составе комплексной терапии нарушений липидного обмена, гиповитаминоз витамина Е.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, обострение хронического холецистита, обострение хронического панкреатита, обострение заболеваний гепатобилиарной системы, желчнокаменная болезнь, патологические состояния, включающие гемморагический синдром.

### **Побочное действие**

Со стороны желудочно-кишечного тракта: рефлюкс или отрыжка с запахом или привкусом рыбы, тошнота, рвота, вздутие живота, диарея или запор. Со стороны кожных покровов: редко - экзема, акне. Возможны аллергические реакции.

### **Взаимодействие**

При одновременном применении с пероральными антикоагулянтами - риск увеличения времени кровотечения. Назначение препарата вместе с варфарином не приводит к каким-либо геморрагическим осложнениям. Однако при комбинированном приеме Омакора и варфарина или прекращении курса лечения Омакором необходим контроль протромбинового времени. Не рекомендуется одновременный прием с фибратами.

### **Передозировка**

Симптомы: проявления гипervитаминоза - боли в эпигастральной области, диспептические явления (тошнота, рвота, диарея); при длительном применении в высоких дозах возможно обострение хронического панкреатита. Лечение: отмена препарата, проведение симптоматич

### **Особые указания**

В связи с умеренным увеличением времени кровотечения (при приеме высокой дозы - 4 капсулы) требуется наблюдение за пациентами, проходящими антикоагулянтную терапию, а при необходимости - соответствующая коррекция дозы антикоагулянта. Проведение этой терапии не исключает необходимости обычного при лечении таких пациентов контроля. Следует принимать в расчет увеличение времени кровотечения у пациентов с повышенным риском геморрагии (в результате тяжелой травмы, хирургической операции и т.п.). При приеме Омакора возможно умеренное повышение активности "печеночных" трансаминаз. У пациентов с нарушением функции печени (особенно при приеме высокой дозы - 4 капсулы) необходим регулярный контроль функции печени (АСТ и АЛТ). У пациентов с нарушением функции почек коррекции дозы не требуется.

### **Литература**

1. Инструкция по медицинскому применению препарата "Омакор". 2. Справочник "Видадь" 2006г.