

Омакор

Автор: admin
01.05.2009 09:03 -

Омакор

Страна-производитель

Дания

Фарм-группа

Другие гиполипидемические средства

Производители

Солвей Фармасьютикалз ГмбХ, произведено ГМ Пэк(Дания)

Международное название

Омега-3 триглицериды

Синонимы Витрум Кардио омега-3

Лекарственные формы

капсулы

Состав Активные вещество: этиловые эфиры омега-3-кислот.

Показания к применению

Профилактика состояний, вызванных нарушением липидного обмена, в составе комплексной терапии нарушений липидного обмена, гиповитаминоз витамина Е.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, обострение хронического холецистита, обострение хронического панкреатита, обострение заболеваний гепатобилиарной системы, желчнокаменная болезнь, патологические состояния, включающие гемморагический синдром.

Побочное действие

Со стороны желудочно-кишечного тракта: рефлюкс или отрыжка с запахом или привкусом рыбы, тошнота, рвота, вздутие живота, диарея или запор. Со стороны кожных покровов: редко - экзема, акне. Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие

При одновременном применении с пероральными антикоагулянтами - риск увеличения времени кровотечения. Назначение препарата вместе с варфарином не приводит к каким-либо геморрагическим осложнениям. Однако при комбинированном приеме Омакора и варфарина или прекращении курса лечения Омакором необходим контроль протромбинового времени. Не рекомендуется одновременный прием с фибратами.

Передозировка

Симптомы: проявления гипervитаминоза - боли в эпигастральной области, диспептические явления (тошнота, рвота, диарея); при длительном применении в высоких дозах возможно обострение хронического панкреатита. Лечение: отмена препарата, проведение симптоматич

Особые указания

В связи с умеренным увеличением времени кровотечения (при приеме высокой дозы - 4 капсулы) требуется наблюдение за пациентами, проходящими антикоагулянтную терапию, а при необходимости - соответствующая коррекция дозы антикоагулянта. Проведение этой терапии не исключает необходимости обычного при лечении таких пациентов контроля. Следует принимать в расчет увеличение времени кровотечения у пациентов с повышенным риском геморрагии (в результате тяжелой травмы, хирургической операции и т.п.). При приеме Омакора возможно умеренное повышение активности "печеночных" трансаминаз. У пациентов с нарушением функции печени (особенно при приеме высокой дозы - 4 капсулы) необходим регулярный контроль функции печени (АСТ и АЛТ). У пациентов с нарушением функции почек коррекции дозы не требуется.

Литература

1. Инструкция по медицинскому применению препарата "Омакор". 2. Справочник "Видадь" 2006г.