

Орунгамин

Автор: admin
09.05.2009 16:46 -

Орунгамин

Страна-производитель

Россия

Фарм-группа

Противогрибковые средства - производные имидазола и триазола

Производители

Озон(Россия)

Международное название

Итраконазол

Синонимы Ирунин, Итразол, Итрамикол, Орунгал, Орунит, Румикоз

Лекарственные формы

капсулы 100мг

Состав Активное вещество - итраконазол.

Показания к применению

Онихомикоз, микозы кожи, полости рта и глаз, вызванные дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибами, системные тропические микозы, вульвовагинальный кандидоз.

Противопоказания

Гиперчувствительность, беременность, лактация.

Побочное действие

Диспепсия, боли в животе, запор, гепатит, повышение аппетита, головная боль, головокружение, периферические нейропатии, дисменорея, повышение уровня трансаминаз в плазме крови, зуд, тромбоцитопения, лейкопения, удлинение времени кровотечения, отеки, гипокалиемия, увеличение массы тела, гипераммониемия, алоpecia, ангионевротический отек, крапивница, зуд.

Взаимодействие

Орунгамин

Автор: admin
09.05.2009 16:46 -

Несовместим с терфенадином, астемизолом, ловастатином, пероральными формами мидазолама и триазолама. Усиливает и/или пролонгирует действие пероральных антикоагулянтов, циклоспорина А, дигоксина, метилпреднизолонa, варфарина, винкристина, блокаторов кальциевых каналов. Рифампицин и фенитоин снижают биодоступность итраконазола, антацидные препараты - всасывание (интервал, разделяющий их прием, должен быть не менее 2 ч).

Передозировка

Данные отсутствуют.

Особые указания

У пациентов с циррозом печени и/или с нарушением функции почек необходимо контролировать концентрацию итраконазола в плазме и при необходимости корректировать дозу. Женщинам детородного возраста в период лечения следует обязательно использовать контрацептивные средства.

Литература

Энциклопедия лекарств 9 издание 2002 года.