

## **Пирацезин**

Автор: admin  
18.06.2009 04:46 -

---

Пирацезин

### **Страна-производитель**

Беларусь

### **Фарм-группа**

Ноотропные средства

### **Производители**

Минскинтеркапс СП Беларусь-США(Беларусь)

### **Международное название**

Пирацетам+Циннаризин

Синонимы Фезам

### **Лекарственные формы**

капсулы

Состав Активные вещества - пирацетам, циннаризин.

### **Показания к применению**

- нарушения мозгового кровообращения: при атеросклерозе сосудов головного мозга, ишемическом инсульте, в период долечивания после геморрагического инсульта; после черепно-мозговых травм;- нарушения памяти, мыслительной функции и концентрации внимания;- нарушения настроения (при подавленности и раздражительности);- энцефалопатии различного генеза;- лабиринтопатии различного генеза (головокружение, шум в ушах, нистагм, тошнота и рвота); синдром Меньера;- профилактика кинетозов;- профилактика мигрени;- для улучшения обучения и памяти детей с отставанием интеллектуального развития.

### **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость, нарушения функции печени и/или почек, паркинсонизм, беременность, лактация.

### **Побочное действие**

Раздражительность, боли в эпигастрии, диспепсия, головная боль, сухость во рту, увеличение массы тела; очень редко светочувствительность, аллергические реакции в

## **Пирацезин**

Автор: admin  
18.06.2009 04:46 -

---

виде кожной сыпи, тремор конечностей, повышенный мышечный тонус.

### **Взаимодействие**

При одновременном применении с Фезамом возможно потенцирование седативного действия средств, угнетающих деятельность центральной нервной системы и алкоголя, а также ноотропных и гипотензивных средств. Сосудорасширяющие средства усиливают действие препарата, а гипертензивные его уменьшают.

### **Передозировка**

Данных о передозировке препарата нет.

### **Особые указания**

Ввиду содержания циннаризина препарат может вызвать положительную реакцию у спортсменов при проведении допинг-теста. Также возможно изменение результатов определения радиоактивного йода (красители в оболочке капсулы содержат йод). В терапевтических дозах (если основное заболевание позволяет) применение препарата допустимо при управлении транспортными средствами и работе с машинами и оборудованием.