

## **Синэрит**

Автор: admin  
14.11.2009 10:35 -

---

Синэрит

### **Страна-производитель**

Россия

### **Фарм-группа**

Антибиотики - макролиды и азалиды

### **Производители**

Синтез АКО, Курган(Россия)

### **Международное название**

Эритромицин

Синонимы Грюнамицин сироп, Илозон, Эомицин, Эригексал, Эридерм, Эрик, Эритран, Эритромицин, Эритромицин 250, Эритромицин лактобионат, Эритромицин Пси Диспертаб, Эритромицин стеарат, Эритромицин стеарейт, Эритромицин-АКОС, Эритромицин-Ратиофарм, Эритромицин-Тева, Э

### **Лекарственные формы**

таблетки покрытые оболочкой кишечнорастворимые 100мг, таблетки покрытые оболочкой кишечнорастворимые 250мг

Состав Активное вещество - эритромицин.

### **Показания к применению**

Инфекции верхних и нижних дыхательных путей, атипичная пневмония, гнойно-воспалительные заболевания кожи и ее придатков, дифтерия, эритразма, гонорея, сифилис, листериоз, болезнь легионеров, профилактика и лечение ревматизма при непереносимости бета-лактамовых антибиотиков; для глазной мази - конъюнктивит, блефарит, трахома (для глазной мази).

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность, заболевания печени, беременность, кормление грудью (на период лечения необходимо прекратить грудное вскармливание).

### **Побочное действие**

Диспептические расстройства (тошнота, рвота, боли в животе и др.), нарушение

## **Синэрит**

Автор: admin  
14.11.2009 10:35 -

---

функций печени, генерализованные судороги, галлюцинации, нарушения сознания, головокружение, обратимое снижение слуха, желудочковая тахикардия, удлинение интервала QT.

### **Взаимодействие**

Потенцирует эффекты и токсичность антигистаминных препаратов, алкалоидов спорыньи, теофиллина и бензодиазепинов, дигоксина, антикоагулянтов непрямого типа действия, карбамазепина, циклоспорина, гексобарбитала, фенитоина, алфентанила, дизопирида, ловастатина и бромокриптина.

### **Передозировка**

Симптомы: нарушение функций печени, вплоть до острой печеночной недостаточности, и потеря слуха. Лечение: промывание желудка, форсированный диурез, гемо- и перитонеальный диализ. Производится постоянный мониторинг за жизненно важными функциями (ЭКГ, электр

### **Особые указания**

Использование эритромицина, содержащего бензол, для внутривенных инъекций иногда сопровождалось развитием фатального синдрома Гаспинга у детей, а также острым лекарственным гепатитом у взрослых и детей.

### **Литература**

Регистр Лекарственных средств 2003 года.