

Синэрит

Автор: admin
14.11.2009 10:35 -

Синэрит

Страна-производитель

Россия

Фарм-группа

Антибиотики - макролиды и азалиды

Производители

Синтез АКО, Курган(Россия)

Международное название

Эритромицин

Синонимы Грюнамицин сироп, Илозон, Эомицин, Эригексал, Эридерм, Эрик, Эритран, Эритромицин, Эритромицин 250, Эритромицин лактобионат, Эритромицин Пси Диспертаб, Эритромицин стеарат, Эритромицин стеарейт, Эритромицин-АКОС, Эритромицин-Ратиофарм, Эритромицин-Тева, Э

Лекарственные формы

таблетки покрытые оболочкой кишечнорастворимые 100мг, таблетки покрытые оболочкой кишечнорастворимые 250мг

Состав Активное вещество - эритромицин.

Показания к применению

Инфекции верхних и нижних дыхательных путей, атипичная пневмония, гнойно-воспалительные заболевания кожи и ее придатков, дифтерия, эритразма, гонорея, сифилис, листериоз, болезнь легионеров, профилактика и лечение ревматизма при непереносимости бета-лактамовых антибиотиков; для глазной мази - конъюнктивит, блефарит, трахома (для глазной мази).

Противопоказания

Гиперчувствительность, заболевания печени, беременность, кормление грудью (на период лечения необходимо прекратить грудное вскармливание).

Побочное действие

Диспептические расстройства (тошнота, рвота, боли в животе и др.), нарушение

Синэрит

Автор: admin
14.11.2009 10:35 -

функций печени, генерализованные судороги, галлюцинации, нарушения сознания, головокружение, обратимое снижение слуха, желудочковая тахикардия, удлинение интервала QT.

Взаимодействие

Потенцирует эффекты и токсичность антигистаминных препаратов, алкалоидов спорыньи, теофиллина и бензодиазепинов, дигоксина, антикоагулянтов непрямого типа действия, карбамазепина, циклоспорина, гексобарбитала, фенитоина, алфентанила, дизопирида, ловастатина и бромокриптина.

Передозировка

Симптомы: нарушение функций печени, вплоть до острой печеночной недостаточности, и потеря слуха. Лечение: промывание желудка, форсированный диурез, гемо- и перитонеальный диализ. Производится постоянный мониторинг за жизненно важными функциями (ЭКГ, электр

Особые указания

Использование эритромицина, содержащего бензол, для внутривенных инъекций иногда сопровождалось развитием фатального синдрома Гаспинга у детей, а также острым лекарственным гепатитом у взрослых и детей.

Литература

Регистр Лекарственных средств 2003 года.