

## **Тиоктацид**

Автор: admin  
20.03.2010 04:53 -

---

Тиоктацид

### **Страна-производитель**

Германия

### **Фарм-группа**

Гепатопротекторные средства

### **Производители**

Хемиверк Хомбург(Германия)

### **Международное название**

Тиоктовая кислота

Синонимы Берлитион 300, Берлитион 300 ораль, Берлитион 300ЕД, Липамид, Липоевая кислота, Тиогамма, Тиоктацид 100 Т, Тиоктацид 200, Тиоктацид 600, Тиоктацид 600 Т, Тиоктацид 600Т, Тиоктацид БВ, Эспа-Липон

### **Лекарственные формы**

25мг, 50мг, таблетки 50мг

Состав Активное вещество: Тиоктовая кислота.

### **Показания к применению**

Коронарный атеросклероз (профилактика и лечение), заболевания печени (болезнь Боткина легкой и средней тяжести, цирроз печени), полинейропатия (диабетическая, алкогольная), отравления солями тяжелых металлов и др. интоксикации.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность, беременность, кормление грудью (на период лечения следует прекратить грудное вскармливание).

### **Побочное действие**

Нарушение метаболизма глюкозы (гипогликемия), аллергические реакции (в т.ч. анафилактический шок); при быстром в/в введении - кратковременная задержка или затруднение дыхания, повышение внутричерепного давления, судороги, диплопия, точечные кровоизлияния в кожу и слизистые, дисфункции тромбоцитов.

### **Взаимодействие**

Усиливает эффекты пероральных гипогликемизирующих препаратов и инсулина. Несовместим с растворами Рингера и глюкозы, соединениями (в т.ч. их растворами), реагирующими с дисульфидными и SH- группами или алкоголем.

### **Передозировка**

Симптомы: головные боли, тошнота, рвота. Лечение: поддержание жизненно важных функций.

### **Особые указания**

Алкоголь ослабляет терапевтическое действие тиоктовой кислоты, поэтому во время лечения необходимо воздержаться от приема алкоголя. При одновременном применении с инсулином и пероральными гипогликемическими средствами необходим постоянный контроль уровня сахара в крови, особенно на начальной стадии лечения. В некоторых случаях во избежание развития гипогликемии требуется уменьшение дозы инсулина или перорального гипогликемического средства. При заболеваниях печени и хронических интоксикациях дозу следует устанавливать индивидуально в зависимости от степени тяжести заболевания, возраста и массы тела больного. Ампулы из упаковки необходимо доставать только непосредственно перед использованием. Раствор для инфузии пригоден для введения в течение 6 ч, если защищен от воздействия света.

### **Литература**

Энциклопедия лекарств, 2004г.