

Цефазолин \"Биохеми\"

Автор: admin
19.07.2010 16:25 -

Цефазолин "Биохеми"

Страна-производитель

Австрия

Фарм-группа

Цефалоспорины первого поколения

Производители

Биохеми ГмбХ(Австрия)

Международное название

Цефазолин

Синонимы Амзолин, Анцеф, Атралцеф, Золин, Золфин, Интразолин, Ифизол, Кефзол, Лизолин, Нацеф, Оризолин, Прозолин, Рефлин, Сефазол, Тотацеф, Цезолин, Цефазолин, Цефазолин Ватхэм, Цефазолин натриевый, Цефазолин натрия, Цефазолин-АКОС, Цефазолин-Тева, Цефазолина натр

Лекарственные формы

порошок для приготовления инъекционного раствора 1г

Состав Активное вещество-Цефазолин.

Показания к применению

Инфекции дыхательных путей, септицемия, эндокардит, остеомиелит, раневая инфекция, инфицированные ожоги, перитонит, инфекции моче- и желчевыводящих путей.

Противопоказания

Гиперчувствительность, в том числе к другим бета-лактамым антибиотикам, беременность, кормление грудью.

Побочное действие

Тошнота, рвота, диарея, боли в эпигастральной области, псевдомембранозный колит, повышение концентрации печеночных ферментов (АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, ЛДГ) в крови, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, лимфоцитоз, гемолитическая анемия, кандидомикоз, аллергические проявления (кожные высыпания,

Цефазолин \ "Биохеми" \

Автор: admin

19.07.2010 16:25 -

зуд, токсический эпидермальный некроз, синдром Стивенса - Джонсона, многоформная эритема, ангионевротический отек, анафилактический шок), реакции в месте введения: образование инфильтратов и абсцессов, флебитов и тромбозов.

Взаимодействие

Пробенецид замедляет экскрецию и способствует кумуляции.

Передозировка

Нет сведений.

Особые указания

Не рекомендуется одновременный прием пероральных антикоагулянтов и диуретиков (фуросемид, этакриновая кислота). С осторожностью назначают пациентам с выраженными нарушениями функций почек, заболеваниями ЖКТ.

Литература

Энциклопедия лекарств 2003г.