

## **Эпомакс**

Автор: admin  
24.09.2010 10:52 -

---

Эпомакс

### **Страна-производитель**

Словения

### **Фарм-группа**

Стимуляторы гемопоэза

### **Производители**

Лек ДД(Словения)

### **Международное название**

Эпоэтин омега

### **Лекарственные формы**

раствор для инъекций 2000МЕ/мл

Состав Действующее вещество - эпоэтин омега.

### **Показания к применению**

Анемия на фоне хронической почечной недостаточности.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность, артериальная гипертензия, беременность (I триместр), кормление грудью (на время лечения прекращают), детский возраст.

### **Побочное действие**

Гипер- или гипотензия, тахикардия, стенокардия, тромбозы, гиперкалиемия, гриппоподобная симптоматика, отеки, утомляемость, судороги икроножных мышц, бронхит, диарея, прурит, анафилактический шок.

### **Взаимодействие**

Данных нет.

### **Передозировка**

Симптомы: увеличение гематокрита, уровня гемоглобина, вязкости крови, гипертензия,

тромбоз. Лечение: антигипертензивная и/или антикоагуляционная терапия (на фоне отмены эритропоэтина).

### **Особые указания**

С осторожностью назначают при ИБС, конвульсиях и амнезии, во II и III триместрах беременности (только по строгим показаниям и в наименьших дозах). Не реже 1-2 раз в неделю следует проводить контроль уровней гемоглобина и гематокрита, содержания калия, креатинина и др. в сыворотке. При терапии пациентов с тромбозами 1 раз в месяц тестируют свертываемость крови. Перед лечением необходимо исключить факторы, способные снизить эффект: недостаточность витамина В12 и фолиевой кислоты, интоксикация алюминием, инфекции, терапия кортикостероидами или иммунодепрессантами.

### **Литература**

Энциклопедия лекарств 2002 г.