

Юринекс

Автор: admin
21.10.2010 14:10 -

Юринекс

Страна-производитель

Югославия

Фарм-группа

Петлевые диуретики

Производители

Инекс Хемофарм(Югославия)

Международное название

Буметанид

Синонимы Буринекс, Буфенокс

Лекарственные формы

таблетки 1мг, раствор для инъекций 0.5мг

Состав Действующее вещество - Буметанид.

Показания к применению

Отечный синдром: отек легких и мозга, застойная сердечная и печеночная недостаточность, цирроз печени, поздний токсикоз беременности.

Противопоказания

Гиперчувствительность (в т.ч. к др. сульфонилам), острая почечная недостаточность, почечная кома, декомпенсированный сахарный диабет, подагра, острый гепатит, гипокалиемия, I триместр беременности.

Побочное действие

Тошнота, боли в животе, сухость во рту, жажда, головокружение, мышечная слабость, нарушения слуха, тромбозы и эмболии, гипокалиемия, гипохлоремия, гипонатриемия, гиперурикемия, гипергликемия.

Взаимодействие

Аминогликозиды и препараты лития повышают риск возникновения нефротоксических

Юринекс

Автор: admin
21.10.2010 14:10 -

эффектов. Калийсберегающие диуретики повышают вероятность гипокалиемии. Пробенецид и индометацин уменьшают диуретические (салуретические) свойства.

Передозировка

Данных нет.

Особые указания

Необходимо контролировать уровень электролитов, мочевой кислоты и глюкозы в крови.

Литература

Энциклопедия лекарств 2004 г. Энциклопедия лекарств 2002 г.